



	FAZA WEGETATYWNA				FAZA GENERATYWNA						
	UKORZENIANIE	I	II		I	II	III	IV			
<b>DNI I TYGODNIE</b>	D1-5	D6-25	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
<b>GODZINY ŚWIATŁA</b>	18	18	12	12	12	12	12	12	12	12	12
<b>Dawka w ml na 10l</b>											
<b>CANNA COCO A</b>	26 - 33	26 - 33	29 - 37	29 - 37	29 - 37	29 - 37	29 - 37	29 - 37	26 - 33	26 - 33	
<b>CANNA COCO B</b>	26 - 33	26 - 33	29 - 37	29 - 37	29 - 37	29 - 37	29 - 37	29 - 37	26 - 33	26 - 33	
<b>CANNA RHIZOTONIC</b>	40	20	20	20	5	5	5	5	5		
<b>CANNAZYM</b>		25	25	25	25	25	25	25	25	25 - 50 *	25 - 50
<b>CANNABOOST</b>			20 **	20	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40
<b>CANNA PK 13/14</b>								15			
<b>CANNA CALMAG AGENT***</b>	0 - 7	0 - 7	0 - 7	0 - 7	0 - 7	0 - 7	0 - 7	0 - 7	0 - 7	0 - 7	0 - 7
<b>CANNA FLUSH</b>									40		40
<b>mS/cm</b>											
<b>EC WODY***</b>	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
<b>EC ODŻYWEK</b>	1,4 - 1,8	1,4 - 1,8	1,6 - 2,0	1,6 - 2,0	1,6 - 2,0	1,6 - 2,0	1,6 - 2,0	2,0 - 2,5	1,4 - 1,8	1,4 - 1,8	
<b>EC CAŁKOWITE</b>	1,8 - 2,2	1,8 - 2,2	2,0 - 2,4	2,0 - 2,4	2,0 - 2,4	2,0 - 2,4	2,0 - 2,4	2,4 - 2,9	1,8 - 2,2	1,8 - 2,2	0,4

Ten schemat uprawy jest przeznaczony dla roślin, które rozwijają kwiaty lub owoce, począwszy od tygodniowej sadzonki lub siewki. Czas trwania każdej fazy może się różnić w zależności od gatunku.

- \* Podwójna dawka CANNAZYM do 50 ml/10l, jeśli podłoże jest ponownie używane.
- \*\* Zwiększ dawkę CANNABOOST do maksymalnie 40 ml/10l w okresie kwitnienia, aby uzyskać dodatkową moc.
- \*\*\* Dawka środka CANNA CALMAG AGENT zależy od wartości EC wody, która idealnie powinna wynosić 0,2-0,4 mS/cm. Jeśli początkowa wartość EC wody wynosi 0,0 Calmag można zastosować w maksymalnej dawce, aby osiągnąć EC 0,4 mS/cm. Jeśli początkowa wartość EC wody jest już wyższa niż 0,0 należy zastosować niższą dawkę Calmagu. Ten przykładowy schemat zakłada, że EC wody wynosi (po dostosowaniu do Calmagu) 0,4 mS/cm.

Aby wydłużyć fazę wzrostu, powtórz zalecane dawki z I fazy wegetatywnej (D6-25). Aby wydłużyć fazę kwitnienia, powtórz zalecane dawki z I fazy generatywnej (W3-W5). Dodaj CANNA PK 13/14 w okresie 3-4 tygodni przed zbiorem. Zalecane pH wynosi od 5,5 do 6,2.

